١	Je	OI	m	b	ır	е	(	d	е	I	n	1	é	d	ic	20	0	:																									
ì																																											
ì												٠			٠													٠							٠	٠							
÷																																											
ì																																											
ì				٠							٠	٠			٠			٠			٠							٠	٠				٠		٠	٠							
T	e	le	ét	o	r	10	):																																				
ì				٠								٠			٠			٠			٠	٠							٠				٠			٠			٠				
ì																												٠					٠										
ŀ																																											
				s																																							
1	w	J	d	5	•																																						
			ì	١								•	١		١	١		١	١	١	١	١	١						١	•		Ì			١	١			١		١		١
1			١	١	۰						١	١																												١	۰	۰	
1			١	٠	٠					٠	٠	٠																												۰	۰	۰	۱
•			١	٠						٠	١	٠	٠	٠	١	٠	۰	١	٠	١	١	٠	۰		٠	٠	٠	١	٠		٠	١	٠	٠	١	۰	٠	۰	٠		٠		۰
1			٠	٠	۰					٠	١	١	٠	١	١	۰	۰	٠	۰	٠	٠	١	۰		١	٠	٠	١	٠	۰		١	١	٠	١	١	۰	۰	٠	۰	۰	۰	۱
			٠	٠							٠		٠		٠			٠		٠	٠	٠			٠				٠			٠				٠			٠		٠		۰

#### Tabla de citas

Utilice esta tabla para registrar las fechas de sus citas con su médico:

Fecha de la cita	Anticoncepción utilizada	Resultado o	ie la pru	ueba de	Firma del médico
	·	Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			
		Positivo		Negativo	
		Fecha:			



# Tarjeta de recordatorio para el paciente



#### Roaccutane® no debe tomarse durante el embarazo.

Roaccutane® puede dañar seriamente al feto si una muier embarazada lo toma.

Si queda embarazada o cree que podría estar embarazada, deje de tomar Roaccutane» inmediatamente y comuníquese con su médico

Lea atentamente el prospecto antes de comenzar el tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de tomar Roaccutane\*, hable con su médico o farmacéutico.

### Qué debe hacer si puede quedar embarazada:

1 Debe usar al menos 1 método anticonceptivo altamente eficaz (como un dispositivo intrauterino o un implante) o usar correctamente 2 métodos efectivos de anticoncepción que funcionan de diferentes maneras (tales como un anticonceptivo oral junto con un condón) antes, durante y por 1 mes después de suspender el tratamiento.

- Usted no debe quedar embarazada mientras toma Roaccutane \*, o durante 1 mes después de suspender el tratamiento.
- Debe asistir a visitas de seguimiento regulares y hacerse pruebas de embarazo regularmente:
  - Antes de comenzar el tratamiento, deberá realizarse una prueba de embarazo, que debe ser negativa.
  - Para asegurarse de que no esté embarazada durante el tratamiento, debe realizarse pruebas de embarazo con regularidad, idealmente todos los meses.
    También debe hacerse una prueba de embarazo final 1 mes después de suspender el tratamiento

## Recordatorio para hombres y mujeres

Este medicamento se le ha recetado a usted, no lo comparta con nadie y devuelva las cápsulas que no utilizó a la farmacia.

"Material creado por Roche"

"Este material/programa no tiene como fin condicionar la prescripción, el uso, la promoción, la venta, la recomendación, la indicación o la aprobación de ningún producto de Roche ni ninguna concesión de beneficios a Roche. No tome el medicamento por su cuenta. Siga exactamente las instrucciones de su medico. Todos los derechos reservados - la reproducción total o parcial esta prohibida sin la autorización previa de Roche Servicios S.A."

## Tarjeta de recordatorio para el paciente

	Nombre del médico:
ı	`
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	Teléfono:
ı	
ı	
ı	
1	Notas: