

Nombre del médico:
.....
.....
.....
.....

Teléfono:
.....
.....
.....

Notas:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

© 2018 | v3

Tabla de citas

Utilice esta tabla para registrar las fechas de sus citas con su médico:

Fecha de la cita	Anticoncepción utilizada	Resultado de la prueba de embarazo	Firma del médico
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Fecha: _____	



Tarjeta de recordatorio para el paciente

Roaccutane[®]
Isotretinoína

Este medicamento requiere receta médica. Todo medicamento posee efectos secundarios. Consulte a su médico.

Roaccutane® no debe tomarse durante el embarazo.

Roaccutane® puede dañar seriamente al feto si una mujer embarazada lo toma.

Si queda embarazada o cree que podría estar embarazada, deje de tomar Roaccutane® inmediatamente y comuníquese con su médico

Lea atentamente el prospecto antes de comenzar el tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de tomar Roaccutane®, hable con su médico o farmacéutico.

Qué debe hacer si puede quedar embarazada:

- ❗ **Debe usar al menos 1 método anticonceptivo altamente eficaz (como un dispositivo intrauterino o un implante) o usar correctamente 2 métodos efectivos de anticoncepción que funcionan de diferentes maneras (tales como un anticonceptivo oral junto con un condón) antes, durante y por 1 mes después de suspender el tratamiento.**

❗ **Usted no debe quedar embarazada mientras toma Roaccutane®, o durante 1 mes después de suspender el tratamiento.**

- ❗ **Debe asistir a visitas de seguimiento regulares y hacerse pruebas de embarazo regularmente:**
 - Antes de comenzar el tratamiento, deberá realizarse una prueba de embarazo, que debe ser negativa.
 - Para asegurarse de que no esté embarazada durante el tratamiento, debe realizarse pruebas de embarazo con regularidad, idealmente todos los meses. También debe hacerse una prueba de embarazo final 1 mes después de suspender el tratamiento

Recordatorio para hombres y mujeres

Este medicamento se le ha recetado a usted, **no lo comparta con nadie y devuelva las cápsulas que no utilizó a la farmacia.**

"Material creado por Roche"

"Este material/programa no tiene como fin condicionar la prescripción, el uso, la promoción, la venta, la recomendación, la indicación o la aprobación de ningún producto de Roche ni ninguna concesión de beneficios a Roche. No tome el medicamento por su cuenta. Siga exactamente las instrucciones de su médico. Todos los derechos reservados - la reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización previa de Roche Servicios S.A."

Tarjeta de recordatorio para el paciente

Nombre del médico:

Teléfono:

Notas: